




**Dawne odmiany gruszy  
uprawiane w Polsce**

## Spis treści

Wstęp – <i>Andrzej A. Przybyła</i> .....	5
Charakterystyka Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego – <i>Jarosław Pająkowski</i> .....	7
Tradycje sadownicze i przetwórcze nad Dolną Wisłą – <i>Renata Sobieralska</i> .....	11
Charakterystyka botaniczna gruszy, pochodzenie oraz historia uprawy – <i>Andrzej A. Przybyła</i> .....	19
Opisy pomologiczne odmian – <i>Andrzej A. Przybyła</i> .....	27
Właściwości drewna – <i>Paweł Kozakiewicz</i> .....	63
Gruszki dla zdrowia – <i>Krystyna Rejman</i> .....	69
Przetwory i desery z gruszek – <i>Jarosław Dumanowski</i> .....	75
Perry – <i>Andrzej A. Przybyła</i> .....	89
Alfabetyczny indeks odmian .....	92
Informacje o autorach.....	93



### Amanlis

Syn. Hubard, Beurré d'Amanlis, Wilhelmine, D'Albert, Poire Amanlis, Amanlis Butterbirn.


**Pochodzenie:** Bretania, ok. 1826 r.

**Drzewo:** Silnie rosnące, o nieregularnej koronie. Gałęzie grube, długie, zwieszające się, zielonkawe. Młode drzewa wrażliwe na mróz, starsze wytrzymałe.

**Owoce:** Duże, ok. 80 mm szer. i 90 mm wys., wydłużone, stożkowate, pękate. Skórka zielonawożółta, rdzawo marmurkowana, rumieniec ciemny czerwono-brązowy, matowy. Szypułka dość krótka, czasami łukowata, zagłębienie szypułkowe płytkie. Kielich półmknięty, zagłębienie kielichowe średnio głębokie.

**Mięższ owoców:** Białe, na obrzeżach nieco zielonkawe, delikatny, soczysty, rozplywający się, aromatyczny, kwaskowato-słodki, nieco muszkatowy. Przy komorze nasiennej komórki kamienne.

**Dojrzewanie owoców:** Początek września, można przechować przez 8-10 dni.



### Ananasówka francuska

Syn. Ananas de Courtrai, Ananas de Courtray, Ananasbirn von Courtray.


**Pochodzenie:** otrzymana w Courtray na terenie obecnej Belgii w 1784.

**Drzewo:** Silnie rosnące, plenne, korona stożkowata. Pędy zielonkawobrzowe, wysmukłe.

**Owoce:** Duże, ok. 80 mm szer. i 100 mm wys., kształtu gruszkowatego, często pękate. Skórka dość gładka, matowa, żółtawozielona, po dojrzeniu zielonożółta, z rdzawymi plamkami. Rumieniec brązowoczerwony. Szypułka mięsista, brązowa, osadzona na szczycie owocu. Kielich otwarty, zagłębienie kielichowe płytkie, wąskie.

**Mięższ owoców:** Żółtawobiały, bardzo delikatny, rozplywający się, soczysty, o smaku słodkowiinnym.

**Dojrzewanie owoców:** Początek września, można przechować przez 5-6 dni.



### Apremontka, Bera Boska

Syn. Bosc's Flaschenbirn, Beurré d'Apremont, Cannelle, Paradis d'Automne, Beurré Bosc.


**Pochodzenie:** znaleziona we Francji w Apremont (Sabaudia), 1835 r.

**Drzewo:** Rośnie średnio silnie, tworzy koronę regularnie stożkową. Pędy grube, krótkie, brązowoczerwone. Drzewa na mroz średnio wytrzymałe, plenne.

**Owoce:** Duże, ok. 70 mm szer. i 100 mm wys., o kształcie gruszkowatym lub butelkowatym. Skórka delikatna, po dojrzeniu jasnożółta, lekko ordzawiona, ze słabym rumieńcem. Szypułka bardzo długa, w płytkim zagłębieniu szypułkowym. Kielich otwarty, zagłębienie kielichowe płytkie.

**Miąższ owoców:** Białe, masłowe, soczyste, bardzo słodkie, o delikatnym korzennym smaku.

**Dojrzewanie owoców:** Koniec września, można przechować przez 3-4 tygodnie.



### Bera Anjou

Syn. Ne plus Meuris, Nec plus Meuris, Die Winter-Meuris, Winter-Meuris, Meuris d'hiver, Beurré d'Anjou.

**Pochodzenie:** otrzymana w 1819 r. w Löwen (Leuven) na terenie obecnej Belgii.

**Drzewo:** Silnie rosnące, korona nieregularna. Pędy umiarkowanie grube i długie, brązowozielone.

**Owoce:** Duże, ok. 80 mm szer. i 80 mm wys., jajowate lub pękato-jajowate. Skórka delikatna, gładka, zielona, później żółta, ze słabym czerwonym rumieńcem i rdzawymi plamkami. Szypułka krótka, gruba, często mięsista, brązowa, w płytkim, wąskim zagłębieniu szypułkowym. Kielich otwarty, zagłębienie kielichowe płaskie, głębokie.

**Miąższ owoców:** Żółtawobiałe, delikatny, rozplywający się, soczysty, słodko-kwaśkowy, korzenny.

**Dojrzewanie owoców:** Przełom września i października, dojrzałość konsumpcyjna połowa listopada do połowy grudnia.

## **Alfabetyczny indeks odmian**

Dawne odmiany gruszy uprawiane w Polsce:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. Amanlis                                    | 17. Esperena, Esperynka          |
| 2. Ananasówka francuska                       | 18. Flamandka                    |
| 3. Apremontka, Bera Boska                     | 19. Kolmarka                     |
| 4. Bera Anjou                                 | 20. Komisówka                    |
| 5. Bera Biała, Kaizerka                       | 21. Krasanka                     |
| 6. Bera Diela, Diel                           | 22. Liońska, Bera Liońska        |
| 7. Bera Hardego, Hardy                        | 23. Lukasówka                    |
| 8. Bera Hardenponta, Szynka,                  | 24. Marja Ludwika                |
| 9. Bera Klerża, Krzywka                       | 25. Napoleńska                   |
| 10. Bera Ligiela, Bera zimowa                 | 26. Potawinka                    |
| 11. Bera skórzana                             | 27. Sapieżanka                   |
| 12. Bera Szara                                | 28. Siostrzyczka                 |
| 13. Bergamota Jesienna,<br>Bergamota czerwona | 29. Tongrówka                    |
| 14. Bezpestkówka, Bezziarnkówka               | 30. Tryumf, Triumf               |
| 15. Duszesa właściwa, Duszesa                 | 31. Urbanistka                   |
| 16. Duanna zimowa,<br>Dziekanka zimowa        | 32. Werte                        |
|   | 33. Williams, Bonkreta Williamsa |